


# TURKEY



Winnipeg

zoological society  
of manitoba  
société zoologique  
du manitoba

## *Meleagris gallopavo*

### Family – Turkeys (*Meleagrididae*)

**Range** – Woodland (e.g., oak and pine) and swamp from southern Ontario to central Mexico.

**Diet** – Seeds, nuts, berries and insects. Zoo diet is grain, oystershell, insects.


**Status** – Formerly abundant but reduced to 30,000 in the early 1900s from over-hunting. Conservation efforts have increased this species to about 7 million.

**Zoo Notes** – This large chicken-like bird is the ancestor of the domestic turkey, raised first by the early natives of Mexico, and taken to Europe in the 16th Century

by the Spanish. Males can weigh over 11 kg (25 lbs) and are distinguished from females by the leg spur and longer beard of chest feathers. It can run at 40 kph and fly at 90 kph. Up to 6,000 feathers run in special tracts in the skin.

Each spring the male turkey begins a ritual of gobbling and strutting to attract females to his personal breeding ground in a forest clearing. The tail feathers are erected in a broad fan and the wings are extended to display the dazzling colors and patterns – all intended to demonstrate the male's fitness. The bright blue head and bright-red wattle add to the impressive show. After mating, each female

prepares a secluded nest of leaves on the ground and lays an egg a day for 8 to 20 days, returning each morning to participate in the courtship dance. Incubation takes 28 days, the chicks leave the nest the first night, and can fly by 6 days, but remain with the hen through the winter.



# DINDON SAUVAGE

## *Meleagris gallopavo*

### Famille – Dindons (*Méléagrididés*)

**Habitat** – Terres boisées (p. ex. chêne et pin) et marais du sud de l'Ontario jusqu'au centre du Mexique.

**Alimentation** – Graines, noix, baies et insectes. Le régime alimentaire au zoo comprend des céréales, des coquilles d'huître et des insectes.

**Statut** – Autrefois cette espèce foisonnait, mais sa population avait été réduite à 30 000 au début des années 1900 à cause de la chasse abusive. Grâce



aux mesures de conservation, cette espèce compte environ 7 millions d'oiseaux.

**Notes** – Ce grand oiseau ressemblant à la poule est l'ancêtre de la dinde domestique. Il a été domestiqué par les autochtones du Mexique et introduit en Europe au XVII<sup>e</sup> siècle par les Espagnols. Le mâle peut peser jusqu'à 11 kg (25 lb) et il se distingue de la femelle par l'ergot de la patte et une barbe de plumes thoraciques plus longue. Le dindon peut courir à 40 km/h et voler à 90 km/h. Jusqu'à 6 000 plumes prennent

racine dans les tissus cutanés.

Chaque printemps, le dindon mâle se met à glousser et à se pavaner pour attirer les femelles dans une clairière qu'il utilise comme lieu d'accouplement. Pour démontrer sa virilité, le mâle dresse ses plumes de queue rectrices en éventail et allonge ses ailes pour exhiber leurs couleurs et leurs formes éblouissantes. La tête d'un bleu brillant et la caroncule rouge écarlate ajoutent à la beauté du spectacle. Après l'accouplement, la femelle construit à l'écart un nid de feuilles sur le sol et y pond

un œuf par jour pendant une période allant de 8 à 20 jours, revenant chaque matin pour participer à la parade nuptiale. L'incubation dure 28 jours et les dindonneaux quittent le nid pendant la première nuit. Ils commencent à voler après 6 jours, mais ils passent l'hiver avec leur mère.