


WOLVERINE

CARCAJOU



Gulo gulo

Family – Weasel (Mustelidae)

Range – Coniferous and deciduous forests and woodlands, and alpine and barren-ground tundra of North America and Eurasia.

Diet – Predator and scavenger of caribou, hares, ground squirrels, birds, insects and some berries. Zoo diet is rabbit, chicken and red meat.

Status – A truly wilderness animal, it has vanished from many areas due to disturbance from human activities and from trapping. It is classified as Endangered in eastern Canada and most of Eurasia, Vulnerable in western Canada, and 'Special Concern' in Manitoba, where trapping is permitted.

Zoo Notes – This largest member of the weasel family (up to 25 kg) has been called "the hyena of the North" due to its scavenging habit and ability to crack open bones for the marrow. It is also a pugnacious hunter, capable of overpowering animals much larger than itself. Solitary for most of the year, the sexes come together briefly to mate from spring to fall. The embryos delay development until January, and about 5 weeks later, 2-6 young are born. Food hidden away earlier in the winter is located and eaten, and then converted to rich milk to feed the young. Longevity in the wild is unknown, but is 17 years in a zoo.

The wolverine has played a major role in the myths of Native Peoples, viewed as a trickster or link to the spirit world. Many-a-trapper has been frustrated by a wolverine raiding the trapline without being caught.




Gulo gulo

Famille – Belette (Mustélidés)

Habitat – Forêts aciculifoliées et caducifoliées, terres boisées et toundras alpines et nordiques de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie.

Alimentation – Prédateur et charognard qui se nourrit de caribous, de lièvres, de spermophiles, d'oiseaux, d'insectes et de certaines baies. Le régime alimentaire au zoo comprend du lapin, du poulet et de la viande rouge.

Statut – Véritable animal sauvage, le carcajou a disparu d'un grand nombre de régions par suite des perturbations causées par l'activité humaine et à cause du piégeage. Il est considéré comme une espèce menacée dans l'Est du Canada et dans presque toute l'Eurasie. Il est vulnérable dans l'Ouest du Canada, et le Manitoba s'en préoccupe d'une façon spéciale en raison du piégeage qui est permis.



Notes – Ce membre le plus massif de la famille de la belette (pesant jusqu'à 25 kg) a été appelé « l'hyène du Nord » à cause de son appétit pour la charogne et de la force de sa mâchoire qui peut fendre un os pour en sucer la moelle. Il est également un chasseur agressif qui peut terrasser des animaux beaucoup plus gros que lui. Bien que solitaires pendant la plus grande partie de l'année, le mâle et la femelle s'accouplent brièvement entre le printemps et l'automne. Les embryons ne commencent à se développer qu'en janvier et la femelle met bas une portée de 2 à 6 petits environ cinq semaines plus tard. Celle-ci retrouve et mange la nourriture qu'elle avait cachée au début de l'hiver et la transforme en lait concentré pour nourrir ses petits. La durée de la vie en liberté est inconnue, mais en captivité elle peut atteindre 17 ans.

Le carcajou a joué un rôle important dans les mythes des Peuples autochtones, étant considéré comme un *trickster* ou un lien avec le monde des esprits. Combien de piégeurs n'ont-ils pas été dépouillés par un carcajou qui maraudait leur ligne de piégeage sans se faire prendre?